

栽培のポイント

排水対策・適期播種・酸度矯正・適正施肥・赤かび病防除(必ず2回)・適期収穫

赤かび病防除(2回)を行っていない麦は、共乾施設等での荷受けはできません。

月・旬	10		11		12			1			2			3			4			5			6
	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上
生育	出芽期				有効分げつ期						無効分げつ期			莖立期			出穂期			登熟期			
主な作業	●排水対策 ●土壌改良材の散布 ●種子消毒 ●初期除草剤 ●播種時期				○麦踏み ●追肥① ○土入れ ○土入れ ●中期除草剤 ○畦溝さらえ・排水口の整備						○追肥② ○土入れ			○網斑病補正防除			●赤かび病防除① ●赤かび病防除②			●収穫(早刈は避ける) 収穫前に雑草抜き			
高品質麦生産のため、適期播種を心掛けましょう!										麦踏み・土入れは土壌が乾いているときに実施													

1. 土壌改良資材(適正pH 6.0~6.5)

◆資材の銘柄と、土壌pHを1上げるのに必要な資材量 (10a当たり)

資材名	施用量	備考
生石灰	100kg	アルカリ分90%でpHが上がりやすい。播種の10日前までに施用し、土とよく混和。
細粒苦土石灰	160kg	アルカリ分55%で、苦土を含む。
ミネラルG	200kg	アルカリ分40%で、ケイ酸や鉄分を含む。

2. 播種量および播種時期 (10a当たり)

品種名	播種適期	播種量	備考
はるさやか	11月20~30日	7~8kg	遅播の場合は播種量を増やす

3. 種子消毒

対象病害虫	薬剤名	処理方法
斑葉病・網斑病 なまぐさ黒穂病 裸黒穂病	トリフミン水和剤	種子1kgに対し、薬剤5gを粉衣。
鳥害防止 斑葉病・網斑病	キヒゲンR-2フロアブル	種子1kgに対し、薬剤20mlを塗布処理。

4. 施肥基準 (10a当たり)

品種名	基肥	追肥	
		追肥① 1月中・下旬	追肥② 2月下~3月上旬
はるさやか	ベスト化成444 40kg	ベスト化成444 25kg	硫安 10kg
		追肥一発 麦追肥名人 25kg	

※大豆後の基肥は30kg/10a。

5. 雑草防除基準

○播種前処理 (10a当たり)

薬剤名	処理時期	使用量	希釈水量	注意事項
ラウンドアップ マックスロード	耕起・播種前又は播種後出芽前(雑草茎葉処理)	200~500ml	50~100ℓ	除草剤散布の際は、周囲の作物に飛散しないようにしましょう!

○播種後 (10a当たり)

薬剤名	処理時期	使用量	希釈水量	備考
リベレーターG	播種後~麦2葉期	4~5kg	—	雑草発生前~イネ科雑草1葉期まで
サターンバアロ粒剤	播種後~麦4葉期	3~5kg	—	雑草発生前~スズメノテッポウ1.5葉期まで
リベレーターフロアブル	播種後~麦3葉期	60~70ml※	100ℓ	雑草発生前~イネ科雑草1葉期まで
サターンバアロ乳剤	播種直後~麦出芽前	500~750ml	70~100ℓ	雑草発生前に散布すると効果が高い。

※リベレーターフロアブルは、使用量が多いと大麦で葉害が発生する恐れがあるため注意する。

★品種特性 (福岡県主要農作物品種特性表(R4.6月)より)

品種名	出穂期 月.日	成熟期 月.日	稈長 cm	穂長 cm	穂数 本/m ²	耐倒伏性	赤かび病
はるさやか	4.5	5.19	87	6.2	630	やや強	やや強

※播種期は、11月25日頃。

○生育期の除草 (10a当たり)

薬剤名	処理時期	使用量	希釈水量	備考
トレファノサイド粒剤2.5	生育期(雑草発生前) ただし、収穫45日前まで	4~5kg	—	カラスミキ、ネズミムギが前年多発した場合は、2回散布すると効果が高い。
トレファノサイド乳剤		200~300ml	100ℓ	
ハーモニーDF(イネ科・広葉)	麦1葉期~節間伸長前	5~10g	100ℓ	イネ科・広葉雑草に効果がある。

※ハーモニーDFは、野菜や豆類等に葉害を生じるので、ドリフトがないように注意。使用後のタンク及び散布器具は、添付の石灰溶かした液を10分間循環させた後、20分間放置し、排水後清水で洗浄する。

6. 網斑病補正防除

●防除適期:3月中下旬(多発した場合は) (10a当たり)

薬剤名	適用病害名	使用量	希釈水量	備考
チルト乳剤25	網斑病	1,000倍	60~150ℓ	収穫21日前まで使用は1回以内


7. 赤かび病防除

かび毒発生防止のため、必ず2回防除を行ってください。(10a当たり)

薬剤名	適用病害名	使用量	希釈水量	備考
ワークアップ粉剤DL	赤かび病	3kg	—	収穫7日前まで使用は3回以内
ワークアップフロアブル		3,000倍	60~150ℓ	
シルバキュアフロアブル		2,000倍		60~150ℓ
ミラビスフロアブル				

※大麦の赤かび病防除適期

1回目: 葯殻抽出期(出穂12~14日後頃) 2回目: 1回目の7~10日後



8. 収穫

○早刈り・高速刈りは厳禁!
・ビール大麦は、25%以下で、コンバインのこぎ胴回転を低速で収穫(穂首が8割以上曲がり、穀粒が黄白色になって収穫開始。)